

**NUOVE ED INTERESSANTI STAZIONI DI *LETHARIELLA INTRICATA* (MORIS)
KROG IN ITALIA MERIDIONALE**

Giovanna POTENZA¹, Simonetta FASCETTI¹, Domenico PUNTILLO², Michele
PUNTILLO²

¹ Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi della Basilicata; ² Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria

Questo lichene fruticoso è stato descritto da Moris come *Stereocaulon intricatum* e successivamente segregato da Theodor Magnus Fries nel genere *Usnea* e infine assegnato da Krog al genere *Lethariella*. La sua distribuzione va dalle Canarie alla Crimea, compreso il bacino mediterraneo. In Italia è estremamente raro ma è ritenuto comune in Sardegna. Dalle ultime ricerche condotte sull'Appennino Calabro-Lucano è emerso che è abbastanza frequente anche nelle regioni Basilicata e Calabria. In queste due regioni sono stati rinvenuti esemplari con talli che raggiungono dimensioni ragguardevoli (fino a 30 cm di lunghezza) e, talora, provvisti di numerosi apotecii. Sui monti del Pollino colonizza il legno di Pini loricati (*Pinus leucodermis*) formando consorzi monospecifici. La specie, ritenuta dapprima epilittica, è frequentissima anche su scorza di vetusti esemplari di vari forofiti (*Abies*, *Fagus*, *Pinus*, *Quercus*). Vengono presentate la distribuzione della specie in Appennino meridionale e i risultati delle osservazioni microscopiche degli apotecii.